

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
V/NRP/03/1589

CANIVERM tbl. ad us. vet.

Tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem, kaķiem, suņu un kaķu dzimtas dzīvniekiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības turētājs un ražotājs:

Bioveta, a.s.

Ivanovice na Hané,

Čehijas Republika

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

CANIVERM tbl. ad us. vet.

Tabletes iekšķīgai lietošanai suņiem, kaķiem, suņu un kaķu dzimtas dzīvniekiem

Fenbendazole, Pyrantely ambonas, Praziquantel

3. ZIŅOJUMS PAR AKTĪVO(AJĀM) VIELU(ĀM) UN CITĀM SASTĀVDAĻĀM

Aktīvās vielas:

1 tablete – 0,7 g satur:

Fenbendazols 150 mg, pirantela embonāts 144 mg, prazikvantels 50 mg

1 tablete – 0,175 g satur:

Fenbendazols 37,5 mg, pirantela embonāts 36,0 mg, prazikvantels 12,5 mg

Palīgvielas : Mikrokristāliskā celuloze, laktozes monohidrāts, kartupeļu ciete, magnija stearāts, Povidons K90, koloidāls silīcija dioksīds

4. INDIKĀCIJA(AS)

Apaļo tārpu un lenteņu izraisītas invāzijas ārstēšana suņu (*Canidae*) un kaķu (*Felidae*) dzimtas dzīvniekiem. (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*).

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Acs cisticerkoze un mugurkaula neurocisticerkoze. Aknu funkciju traucējumi.

Nelietot vienlaicīgi ar piperazīnu vai citiem pretparazītiem līdzekļiem.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Dažu stundu laikā pēc aplicēšanas var parādīties vemšana, mīksti izkārnījumi, nātrene vai drudzis. Tā ir reakcija uz olbaltumvielām, ko izdala bojāejošie parazīti, nevis zāļu izraisītas reakcijas.

Produkts var izraisīt dzīvnieka miegainību.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRKA SUGAS

Suņu (*Canidae*) un kaķu (*Felidae*) dzimtas dzīvnieki: suņi, kaķi, vilki, šakāļi, lauvas, hiēnas.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA

Kucēniem, mazo šķirņu suņiem un kaķiem:

- 1 tablete 0,175 g uz 0,5 - 2 kg ķermeņa svara
- 1/2 tablete 0,7 g vai 2 tabletes 0,175 g uz 2 - 5 kg ķermeņa svara

Vidējo šķirņu suņiem:

- 1 tablete 0,7 g vai 4 tabletes 0,175 g uz 5 - 10 kg ķermeņa svara

Lielo šķirņu suņiem un liela auguma gaļēdājiem:

- 1 tablete 0,7 g uz katriem 10 kg ķermeņa svara

Lietošanas veids: iekšķīgai lietošanai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tabletes var aplicēt atsevišķi vai paslēpjot barības gabaliņā. Neaplicēt kopā ar piena produktiem.

Deva jāaplicē negaidīti.

Kaķu un suņu dzimtas dzīvniekiem ieteicams aplicēt tabletes (proporcionāli to svaram) saberztā veidā iejauktas gaļas masā. Šīs gaļas bumbiņas novieto attiecīgā skaitā krātiņos pirms rīta ēdināšanas.

Kucēnus un kaķēnus attārpo no 3 nedēļu vecuma ik pēc 3 nedēļām līdz 12 nedēļu vecumam. Pēc tam tos regulāri attārpo ik pēc 3 mēnešiem.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Preparāts nav paredzēts lietošanai produktīvajiem dzīvniekiem.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no gaismas. Uzglabāt sausā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc EXP: {mēnesis/gads}.

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Grūsnām kucēm jāievēro precīza deva.

Par iespējamām blakusparādībām konsultēties ar veterinārārstu.
Nelietot klīniski slimiem dzīvniekiem, izņemot ar zarnu parazītu invāzijas simptomiem.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām .

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

30/01/2009

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles