

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Dehinel Plus XL tabletes suņiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovēnija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francija
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Dehinel Plus XL tabletes suņiem

Praziquantel, pyrantel embonate, febantel

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra tablete satur:

| | |
|--------------------|--------|
| Prazikvantels | 175 mg |
| Pirantela embonāts | 504 mg |
| Febantels | 525 mg |

Ovālas, abpusēji izliektas tabletes ar nošķeltām malām un abpusēju dalījuma līniju. Viegli zaļi dzeltenā krāsā.

Tableti var sadalīt divās vienādās daļās.

4. INDIKĀCIJAS

Pieaugušiem suņiem jauktu nematožu un cestozu invāziju ārstēšanai, kuras ierosina sekojošas parazitū sugas:

Nematodes:

Cērmes: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (pieauguši parazitīti un nenobriedušu kāpuru formas vēlā stadijā)

Āķtārpi: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (pieauguši parazitīti)

Cestodes:

Lenteņi: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem.

Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

Nepārsniedz noteiktās devas, lietojot grūsnām kucēm.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ļoti retos gadījumos var novērot vemšanu ar vai bez caurejas.

Veterināro zāļu blakusparādību sastopamības biežums norādīts sekojošā secībā:

- ļoti bieži (vairāk nekā 1 no 10 dzīvniekiem novērota(-s) nevēlama(-s) blakusparādība(-s) viena ārstēšanas kursa laikā);
- bieži (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 100);
- retāk (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 1000);
- reti (vairāk nekā 1, bet mazāk nekā 10 dzīvniekiem no 10000);
- ļoti reti (mazāk nekā 1 no 10000 dzīvniekiem, ieskaitot atsevišķus gadījumus).

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakus parādības vai citu iedarbību, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi (lieli un ļoti lieli).

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Ieteicamā deva ir 15 mg/kg ķermeņa svara (ĶS) febantela, 14,4 mg/kg ĶS pirantela un 5 mg/kg ĶS prazikvantela. Tas atbilst 1 tabletei uz 35 kg ķermeņa svara.

Tabletes var tikt sadalītas divās vienādās daļās.

Pirms vai pēc ārstēšanas badošanās nav nepieciešama. Tableti(es) var dot tieši sunim mutē vai piemaisīt barībai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Lai nodrošinātu pareizu devu lietošanu, ķermeņa svars ir jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Toxocara kontrolei laktējošām kucēm vajadzētu dot 2 nedēļas pēc dzemdībām un ik pēc 2 nedēļām līdz atšķiršanai.

Ja ir spēcīga apaļo tārpu invāzija, tad var atkārtoti attārpot pēc 14 dienām. Regulāra vienas devas attārpošana pieaugušiem suņiem jāveic ik pēc 3 mēnešiem.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Izplatīta lenteņa tipa - *Dipylidium caninum* - starpsaimnieki ir blusas. Lenteņu invāzija

pilnīgi noteikti radīsies atkārtoti, ja netiks veikta starpsaimnieku, piemēram, blusu, peļu, apkarošana.

Īpaši norādījumi lietošanai dzīvniekiem:

Šīs veterinārās zāles nav paredzētas lietošanai suņiem, kas vieglāki par 17,5 kg. Daļēji izlietotas tabletes ir jāiznīcina.

Īpaši norādījumi personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pareizas higiēnas ievērošanas nolūkā personai, kura dod tabletes tieši sunim mutē vai piemaisa barībai, pēc tam jānomazgā rokas.

Ja notikusi nejausa norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju ārstam.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā:

Pirms grūsnu dzīvnieku ārstēšanas konsultējieties ar veterinārārstu.

Drīkst lietot laktācijas laikā.

Nelietot kucēm grūsnības pirmo divu trimestru laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nelietojiet vienlaicīgi ar piperazīna savienojumiem, jo var samazināties pīrantela un piperazīna (ir daudzu suņiem paredzētu prettārpu līdzekļu sastāvā) pretparazitārā iedarbība.

Vienlaicīga lietošana ar citiem holīnerģiskiem savienojumiem var radīt toksicitāti.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Šo produktu suņi panes labi. Lietošanas drošības pētījumos devas, kas 5 reizes vai vairāk pārsniedza ieteicamo devu, izraisīja gadījuma rakstura vemšanu.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

12/2015.

15. CITA INFORMĀCIJA

Perforēts Al-Al blisteris: 2 tabletes (1 blisteris ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 4 tabletes (2 blisteri ar 2 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 10 tabletes (1 blisteris ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 12 tabletes (2 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 24 tabletes (4 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 30 tabletes (3 blisteri ar 10 tabletēm vai 5 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 50 tabletes (5 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 60 tabletes (10 blisteri ar 6 tabletēm vai 6 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 100 tabletes (10 blisteri ar 10 tabletēm) kastītē.

Perforēts Al-Al blisteris: 102 tabletes (17 blisteri ar 6 tabletēm) kastītē.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija
Tel.: 67338610
Fakss: 67338151

Bezrecepšu veterinārās zāles.

60 tablešu iepakojumiem:

Veterinārārsta zīmogs

- Dzīvnieka īpašnieka vārds:

.....

- Dzīvnieka vārds:

.....

- Devas:.....

.....

- Sērija/Lot:

- Derīgs līdz/EXP: