

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA V/NRP/95/0160

Frontline Spray 2,5 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

MERIAL

29, avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

MERIAL

4 chemin du Calquet

31300 Toulouse

Francija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Frontline Spray 2,5 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums suņiem un kaķiem.
Fipronil

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur –

Aktīvās vielas:

Fipronils 2,5 mg

Palīgvielas

Kopovidons

Izopropanols

Attīrīts ūdens

4. INDIKĀCIJA(-AS)

Suņiem blusu (*Ctenocephalides spp.*) un ērcu (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

Kaķiem blusu (*Ctenocephalides felis*) un ērcu (*Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*) invāzijas ārstēšanai un profilaksei.

Blusu alerģiskā dermatīta ārstēšanai un profilaksei.

Matgraužu invāzijas ārstēšanai un profilaksei suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot slimiem (sistēmiskās slimības, drudzis) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem, jo var izraisīt nevēlamās blakusparādības un var izsaukt letālu iznākumu.

6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja notikusi laizīšana, īslaicīgi var novēro hipersalivāciju, kā dabisku atbildes reakciju. Pēc lietošanas, starp ļoti retām kaitīgām atbildes reakcijām novērotas ātri pārejošu ādas reakcijas, kā eritrēma, nieze vai alopēcija. Izņemot hipersalivāciju, pēc lietošanas, var novērot atgriezeniskus neiroloģiskus simptomus (hiperestēzija, depresija, satraukuma simptomi), vemšanu vai respiratoros simptomus. Nepārdozēt.

7. MĒRĶA SUGAS

Suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Minimālais intervāls starp apstrādes reizēm ir 4 nedēļas, jo nav veikti pētījumi par zāļu drošību.

Ievadīšanas ceļš: ārīgai lietošanai, aplicējot uz apmatojuma.

Devas: aplicē 3-6 ml uz 1 kg ķermeņa svara. (7,5 mg-15 mg fipronila uz 1 kg ķermeņa svara), t.i., 2-4 250 ml un 500 ml flakona spiedieni, vai 6-12 100 ml flakona spiedieni uz kg ķermeņa svara.

Lietošanas veids: visu dzīvnieka ķermeni apsmidzina no aptuveni 10-20 cm attāluma.

Izsmidzina pretēji matu augšanas virzienam un pārliecinās, vai viss apmatojums ir samitrināts līdz ādai. Apmatojumu sabužina, it īpaši garspalvainiem dzīvniekiem, tā lai zāles nokļūtu līdz ādai – uz dzīvnieka muguras, sāniem, vēdera, kājām, pleciem un kakla.

Dzīvnieka galvu un apvidu ap acīm apstrādā, uzsmidzinot Frontline Spray cimdotai rokai un ar to uzmanīgi ierīvējot apmatojumu. Atļauj nožūt dabīgi. Nesusināt ar dvieli.

Preparāta iedarbības ilgums pret ērcēm ir līdz 5 nedēļām, 1-3 mēnešus prēt blusām un 63 dienas (suņiem) vai 42 dienas (kaķiem) pret matgraužiem.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Skat. 8 p-tu.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Ugunsnedrošs šķidrums.

Uzglabāt sausā vietā.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Izvairīties no šķīduma kontakta ar dzīvnieka acīm.

Svarīgi nodrošināt, lai dzīvnieki pēc preparāta lietošanas nelaizītu viens otru.

Suņiem nav pieļaujama peldēšanās atklātās ūdenstilpnēs 2 dienas pēc aplikācijas.

Iespējama atsevišķu ērcu piesūkšanās. Šī iemesla dēļ nelabvēlīgu apstākļu gadījumā infekcijas slimību pārnese nevar tikt pilnībā izslēgta.

Šīs zāles var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu. Tādēļ jāizvairās no kontakta ar mutes gļotādu un acīm. Dzīvniekiem vai kopējiem ar pastiprinātu jutību pret insekticīdiem vai spirtu vajadzētu izvairīties no kontakta ar Frontline Spray. Ja notikusi preparāta saskare ar rokām, nekavējoties, mazgāt rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi nejauša iekļūšana acīs, nekavējoties tās skalot ar tīru ūdeni.

Pēc lietošanas mazgāt rokas.

Apstrādātus dzīvniekus nedrīkst glaudīt līdz aplikācijas vieta ir izzuvusi, un bērniem nedrīkst ļaut saskarties ar tikko apstrādātiem dzīvniekiem. Tāpēc ieteicams dzīvniekus ārstēt nevis pa dienu, bet agri vakarā un nesen apstrādātiem dzīvniekiem neļaut gulēt pie saimniekiem, īpaši bērniem.

Lietošanas laikā nedrīkst smēķēt, dzert vai ēst.

Produkta drošība tika pierādīta suņiem un kaķiem lietojot devās, kas 5 reizes pārsniedz ieteicamo devu 3 mēnešu laikā.

Nevēlamo reakciju risks var palielināties, pārdozējot zāles. Lai no tā izvairītos, vienmēr jāievēro devas saskaņā ar ķermeņa svaru.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Fipronils nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs, jo tas var apdraudēt zivis un citus ūdenī dzīvojošus organismus. Nepiesārņot dīķus, ūdens kanālus, notekgrāvjus ar produktu vai tukšiem iepakojumiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

03/2015

15. CITA INFORMĀCIJA

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi.