

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/12/0063

**Fypyryst** 2,5 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums kaķiem un suņiem  
*Fipronil*

### 1. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Slovēnija

### 2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

**Fypyryst** 2,5 mg/ml uz ādas izsmidzināms aerosols, šķīdums kaķiem un suņiem  
*Fipronil*

### 3. AKTĪVOVIELU UN CITU VIELU DAUDZUMS

1 ml dzidra, bezkrāsaina šķīduma satur 2,5 mg fipronila.

### 4. INDIKĀCIJA(AS)

Blusu un ērcu invāzijas ārstēšanai un profilaksei kaķiem un suņiem, un kā daļa no blusu alerģiskā dermatīta (BAD) ārstēšanas stratēģijas kaķiem un suņiem.

Zāles ir aktīvas pret *Ixodes* sugām ieskaitot *Ixodes ricinus*, kas ir nozīmīgs Laima slimības pārnēsātājs. Zāles kontrolē *Trichodectes canis* utu invāziju suņiem un *Felicola subrostratus* utu invāziju kaķiem.

Insekticīdā darbība pret pieaugušu blusu jaunu invāziju saglabājas līdz 3 mēnešiem suņiem un līdz 2 mēnešiem kaķiem, kas atkarīgs no vides apstākļiem. Zālēm piemīt noturīga akaricīda iedarbība līdz 1 mēnesim pret ērcēm suņiem un kaķiem, kas atkarīgs no vides iedarbības pakāpes.

### 5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot slimiem dzīvniekiem (sistēmiskas slimības, drudzis) vai dzīvniekiem atveseļošanās periodā.

Nelietot trušiem, jo iespējamās nevēlamās reakcijas un pat nāves iestāšanās.

Nelietot, ja konstatēta hipersensitivitāte pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

### 6. NEVĒLAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Ja dzīvnieks laizās, var novērot neilgu pastiprinātas siekalošanās periodu, galvenokārt nesējvielas īpašību dēļ.

Starp ļoti retām nevēlamajām blakusparādībām pēc lietošanas ir ziņots par pārejošām ādas reakcijām, piemēram, eritēmu, niezi vai alopeciju. Atsevišķos gadījumos pēc lietošanas novērota pastiprināta siekalošanās, atgriezeniski neiroloģiski simptomi (paaugstināts jutīgums, depresija, ar nerviem saistīti simptomi), vemšana vai respiratori simptomi.

Nepārdozēt.

Ja rodas nopietnas blakusparādības vai citas parādības, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

## **7. MĒRĶA SUGAS**

Kaķi un suņi.

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIĒKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN PAŅĒMIENA**

Mehāniskā pumpja aerosols ārīgai lietošanai; 0,5 ml (100 ml pudele) vai 1,5 ml (250 ml pudele) vai 3 ml (500 ml pudele) vienā pūtienā.

### Lietošanas veids:

Apsmidzināt visu dzīvnieka ķermeni aptuveni no 10-20 cm attāluma.

Izsmidzina pretēji matu augšanas virzienam un pārlicinieties, vai viss apmatojums ir samitrināts.

Apmatojumu sabužina, it īpaši garspalvainiem dzīvniekiem, tā lai produkts nokļūtu līdz ādai.

Dzīvnieka galvu un apvidu ap acīm, kā arī jaunus un nervozus dzīvniekus apstrādā, uzsmidzinot cimdota rokai un ar to uzmanīgi ierīvējot apmatojumu.

Atļaut nožūt dabīgi. Nesusināt ar dvieli.

Devas: Lai samitrinātu apmatojumu līdz ādai, lietojiet 3–6 ml uz kilogramu svara (7,5–15 mg aktīvās vielas uz kilogramu svara), atkarībā no apmatojuma garuma tas ir 6–12 piespiešanas reizēm uz kilogramu svara, lietojot 100 ml iepakojumu, ar 2–4 piespiešanas reizēm, lietojot 250 ml iepakojumu, vai 1–2 piespiešanas reizēm, lietojot 500 ml iepakojumu.

Īpašības: Preparāts satur pārklājošu vielu. Tādēļ izsmidzinot veidojas kārtiņa un apmatojums kļūst spīdīgs.

Droši var apstrādāt kucēnus un kaķēnus no 2 dienu vecuma.

Guļvietu, paklāju un mīksto mēbeļu apstrāde ar piemērotiem insekticīdiem palīdzēs novērst kairinājumu vidē un paildzinās produkta sniegto aizsardzību pret atkārtotu invāziju.

Produkts nav piemērots tiešai vides apstrādei.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Ar 100 ml iepakojumu aptuveni 8 reizes var apstrādāt īsspalvainu vidēja izmēra kaķi (4 kg). Ar 250 ml iepakojumu aptuveni 4 reizes var apstrādāt īsspalvainu vidēja izmēra suni (20 kg). Ar 500 ml iepakojumu aptuveni 4 reizes var apstrādāt īsspalvainu liela izmēra suni (40 kg).

Tā kā nav veikti pētījumi par drošību, minimālais intervāls starp ārstēšanas reizēm ir 4 nedēļas.

Optimālam efektam divas dienas pirms vai pēc ārstēšanas nav ieteicams mazgāt dzīvniekus vannā vai ar šampūnu. Mazgāšana vannā vai ar šampūnu līdz četras reizes divu mēnešu laikā būtiski neietekmē produkta efektivitāti. Ja mazgāšanu ar šampūnu veic biežāk, ieteicama apstrāde ar produktu reizi mēnesī.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nav piemērojams.

## 11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Ļoti viegli uzliesmojošs.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Nelietot, ja beidzies derīguma termiņš, kurš norādīts uz iepakojuma pēc „EXP”.

Derīgums pēc pirmās ārējā iepakojuma atvēršanas: 1 gads.

## 12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Nepārsniegt ieteikto devu.

Izvairīties no produkta saskares ar dzīvnieka acīm.

Neizsmidzināt tieši uz bojātas ādas.

Ļaujiet apstrādātajiem dzīvniekiem nožūt labi vēdināmā telpā.

Nenovietojiet dzīvnieku slēgtā telpā vai dzīvnieka transportēšanas kastē, kamēr apmatojums nav pilnībā nožuvis.

Tā kā nav specifisku datu par panesamību un efektivitāti, šo produktu neiesaka lietot citu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus un suņus.

Ir svarīgi pieskatīt, lai dzīvnieki pēc apstrādes nelaizītu cits citu.

Suņiem nav pieļaujama peldēšanās atklātās ūdenstilpnēs 2 dienas pēc aplikācijas.

Dzīvniekam iespējama atsevišķu ērcu pieķeršanās. Šī iemesla dēļ nelabvēlīgu apstākļu gadījumā nevar pilnībā izslēgt infekcijas slimību pārnesanas iespēju.

Vismaz 30 minūtes pēc līdzekļa izsmidzināšanas un līdz apmatojuma pilnīgai nožūšanai turiet apstrādātos dzīvniekus atstatu no uguns vai citiem siltuma avotiem, kā arī virsmām, kuras varētu ietekmēt alkoholu saturošais izsmidzināmais līdzeklis. Neizsmidzināt atklātas liesmas vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

Tikai ārīgai lietošanai.

Laboratoriskajos pētījumos netika konstatēta fipronila teratogēna iedarbība uz žurkām un trušiem.

Pēc fipronila lietošanas laktējošām kucēm kucēni to panes ļoti labi.

Nav pieejami dati no specifiskiem pētījumiem ar grūsnām kaķenēm vai laktējošām kaķenēm.

Nevēlamo reakciju risks (skatīt apakšpunktu 6.) var palielināties, pārdozējot zāles. Lai no tā izvairītos, vienmēr jāievēro pareizas devas saskaņā ar ķermeņa svaru.

### **Piesardzība lietošanā**

Šis produkts var izraisīt gļotādu un acu kairinājumu. Tādēļ jāizvairās no produkta saskares ar muti vai acīm.

Ar šīm veterinārajām zālēm nedrīkst nonākt saskarē lietotāji, kam ir zināma paaugstināta jutība pret insekticīdiem vai alkoholu. Izvairieties no satura saskares ar pirkstiem. Ja tā notiek, mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.

Ja notikusi nejauša nonākšana acīs, uzmanīgi skalojiet ar tīru ūdeni.

Apstrādātu dzīvniekus nedrīkst aiztikt, kamēr apmatojums nav nožuvis, un bērniem nedrīkst ļaut rotaļāties ar apstrādātiem dzīvniekiem, kamēr apmatojums nav nožuvis. Tādēļ dzīvnieku apstrādi ieteicams veikt nevis dienas laikā, bet gan agrā pievakarē, un nesent apstrādātiem dzīvniekiem nedrīkst ļaut gulēt kopā ar to saimniekiem, jo īpaši bērniem.

Izsmidziniet līdzekli uz dzīvnieku ādas atrodoties ārā vai labi vēdināmā telpā.

Neieelpojiet aerosolu. Lietošanas laikā nedrīkst smēķēt, dzert vai ēst.

Veicot dzīvnieku apstrādi, valkājiet PVC vai nitrila cimdus. Apģērba aizsardzības nolūkā ieteicams valkāt ūdensnecaurlaidīgu priekšautu.

Ja apģērbs tiek stipri samitrināts ar produktu, tas jānovelk un pirms atkārtotas valkāšanas jāizmazgā.

Pēc lietošanas izmetiet cimdus un pēc tam mazgājiet rokas ar ziepēm un ūdens.

Ja produkts uzšļakstās uz ādas, nekavējoties mazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Ja rodas kairinājums, meklējiet medicīnisku palīdzību. Īpaši jutīgi pret produktu var būt cilvēki ar zināmu paaugstinātu jutību vai astmu. Nelietojiet produktu, ja jums ir iepriekš bijusi reakcija pret to.

Vairāku dzīvnieku ārstēšana: ja jāārstē vairāki dzīvnieki, laba ventilācija ir īpaši svarīga. Apstrādājiet vairākus dzīvniekus āra apstākļos vai maziniet tvaiku veidošanos, pārvietojot dzīvniekus no telpas, kur veikta apstrāde, kamēr alkohols iztvaiko, un raugieties, lai telpa, kurā veikta apstrāde, starp apstrādes reizēm tiktu labi vēdināta. Turklāt raugieties, lai labi vēdināta tiktu arī telpa, kurā dzīvnieks nožūst, un izvairieties no vairāku nesen apstrādātu dzīvnieku atrašanās vienā nelielā telpā.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR**

Jebkuras neizlietotās veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Fipronils var negatīvi ietekmēt ūdenī dzīvojošus organismus. Pilni vai tukši iepakojumi nedrīkst nonākt ūdens tilpnēs. Jautājiet savam veterinārārstam kā rīkoties ar zālēm, kuras Jums nav nepieciešamas. Tas palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

28.09.2012

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Bezrecepšu veterinārās zāles.

Necaurspīdīga, balta 100 ml augsta blīvuma polietilēna pudele ar mehānisko pumpi, 0,5 ml tilpuma vienā pūtienā.

Necaurspīdīga, balta 250 ml augsta blīvuma polietilēna pudele ar mehānisko pumpi, 1,5 ml tilpuma vienā pūtienā.

Necaurspīdīga, balta 500 ml augsta blīvuma polietilēna pudele ar mehānisko pumpi, 3,0 ml tilpuma vienā pūtienā.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvi:

SIA KRKA Latvija

Mūkusalas iela 101, Rīga

LV-1004, Latvija

Tālr.: +371 67338610

Fakss: +371 67338151